download unter www.biologiezentrum.at

Über einige neue afrikanische Ephydrinen.

Von Dr. Günther Enderlein, Berlin.

Ephydridae. — Ephydrinae.

Haplochila nov. spec.

Typus: H. speculifera nov. spec., Westafrika.

Diese Gattung unterscheidet sich von Ochthera Latr. 1803 durch das lange spitz keilförmige Labrum, daß bei Ochthera kurz halbkreisförmig oder zungenförmig abgerundet ist.

In dieses Genus ist einzuordnen: H. chalybescens (Loew 1863) aus Südafrika.

Haplochila speculifera nov, spec.

♂♀. Kopf schwarz; Untergesicht mit lebhaft messinggelbem dichten Toment, Backen mit silberweißem Toment. Die Fühlergrube ist eine flache sehr wenig eingesenkte, fast ebene und glatte, spiegelähnliche, wenig chagrinierte Fläche, die zungenförmig die Mitte des Untergesichtes einnimmt, am Ende des 1. Drittels beginnend; der Seiten- und Vorderrand ist ziemlich scharf gerandet, vorn ist sie abgerundet. Stirn stark eingesenkt, mit bläulichem Glanz, Seiten mit rostbraunem Reif. Fühler dunkelbraun. Thorax matt schwarz, Pleuren mit silberweißem Toment, Mesopleure mit braunem Keilfleck. Rückenschild mit dichtem braunen Toment, zwei mediane dunkelgelblichbraune schmale Längsstriemen lassen einen Zwischenraum zwischen sich, der die gleiche Breite hat wie sie selbst. Scutellum glatt schwarz, ein wenig chagriniert, spärlich braun tomentiert; die 4 Borsten kräftig und spitz. Abdomen matt schwarz mit braunem Toment. Haltere lebhaft rostfarben. Coxen schwarz mit weißlichem Reif (Toment), Schenkel schwarz, Vorderschenkel sehr groß und dick. außen mit weißlichem Toment, das oben etwas gelblichbräunlich getönt ist. Schienen und Tarsen hell rostbraun. Vorderschiene bis zur Insertion des 1. Tarsengliedes so lang wie dieses; der überstehende schwarze Zahn fast ebenso lang. Flügel leicht gebräunt, Adern dunkelrostbraun.

Körperlänge $6^1/_4$—$6^1/_2$ mm, Flügellänge $5^1/_2$—6 mm.

Westafrika, Uëlleburg Juni bis August 1908. 1 ♂, 1 ♀ gesammelt von G. Teßmann.

download unter www.biologiezentrum.at

Spanisch Guinea, Nkolentangan. November 1907. 1 ♀ gesammelt von G. Teßmann.

Haplochila nigripes nov. spec.

Kopf, Thorax, Abdomen und Beine schwarz, Haltere hell rostgelb. Fühlergrube nicht entwickelt. Vordercoxen mit weißem Reif. Vorderschenkel außen mit gelbem Toment. Flügel leicht gebräunt, Adern dunkelbraun.

Körperlänge $4^1/_2$ mm, Flügellänge $4^1/_2$ mm.

Britisch-Ostafrika, Taita beim Ort Ndi. 1 ♀ gesammelt von Hildebrandt.

Ochthera Latr. 1803.

Ochthera Friederichsi nov. spec.

♀. Kopf matt schwarz; Labrum, Untergesicht und Backen mit lebhaftem silberweißen Toment, obere Hälfte des Untergesichtes mit gelbem Toment. Stirn mit weißlichem Glanz. Seiten mit dunkel rostbraunem Reif. Thorax matt schwarz mit weißem Toment, Rückenschild mit sehr feinem braunen Toment. Abdomen und Beine schwarz mit weißlichem dünnen Toment. Vorder- und Mitteltarsen rostbräunlich. Vorderschiene bis zur Insertion des 1. Tarsengliedes etwas länger als dieses, der überstehende Zahn fast ebenso lang. Haltere blaß bräunlichgelb. Flügel schwach rostbräunlich getrübt, Adern dunkel rostbraun, an der Basis hell rostbraun.

Körperlänge 5 mm. Flügellänge $4^1/_2$ mm.

Madagascar, Taranarivo. 1 ♀ gesammelt von Dr. Friederichs.

Gewidmet wurde diese Species dem Sammler.